

STOP à la grippe aviaire


PROTÉGEZ VOS VOLAILLES. PROTÉGEZ VOTRE EXPLOITATION

Contrôle des accès



- Autorisez uniquement **les personnes, véhicules, outils et caisses** dont la présence est nécessaire dans l'exploitation.
- Appliquez rigoureusement les mesures de désinfection à **toute personne ou tout objet** entrant sur l'exploitation, en particulier après un contact récent avec des volailles, des déchets de volailles ou des oiseaux sauvages.
- Portez systématiquement des **vêtements propres** et **lavez vos mains** et **vos chaussures** lorsque vous entrez dans l'exploitation.

Toutes dedans, toutes dehors



- Mettez en production **des volailles du même âge** en même temps et **retirez-les ensemble** à la fin du cycle de production. Vous améliorerez ainsi l'efficacité de la production et réduirez les visites sur l'exploitation, ce qui diminue le risque d'introduction de maladies au sein de l'élevage.

Nettoyage complet




- **Nettoyez et désinfectez régulièrement toutes les installations**, en particulier après chaque cycle de production.
- Séparez clairement les sections « **propres** » (en contact avec les animaux) et « **sales** » (en contact avec les zones extérieures) de l'exploitation.

Alimentation et eau




- N'utilisez pas d'aliments qui auraient pu être exposés à la **saleté, aux fientes ou à l'humidité**.
- Pour éviter toute contamination, entreposez systématiquement les aliments pour animaux dans des **conteneurs fermés** ou **hydrofuges** et la litière dans des zones fermées ou couvertes.
- Fournissez de **l'eau potable fraîche et propre** à vos volailles.

Pas de place pour les oiseaux sauvages



- Utilisez des poulaillers dotés de **toits solides, de parois étanches et de clôtures hermétiques**.
- Évitez de **déplacer les aliments d'un élevage à l'autre** et veillez à ce qu'il n'y ait pas d'eau stagnante autour de l'exploitation.
- Protégez les espaces extérieurs avec des filets ou des enclos **grillagés** et **n'oubliez pas de vérifier régulièrement la présence éventuelle de trous ou d'ouvertures**. Des dispositifs d'effarouchement ou de dissuasion peuvent également contribuer à éloigner les oiseaux sauvages.

Une espèce, un espace



- Les différentes espèces de volailles — comme les poulets, les canards et les dindes— **doivent être tenues à l'écart** les unes des autres afin d'éviter la propagation des maladies entre les espèces.

Détectez les signes



- Si vous remarquez un signe inhabituel dans votre élevage, comme une diminution de la consommation de nourriture ou d'eau, une mortalité soudaine ou d'autres symptômes de maladie, **signalez-le immédiatement** à votre vétérinaire ou aux autorités sanitaires locales.
- Une mise en place rapide des mesures appropriées augmentera vos chances d'enrayer une grave épidémie de grippe aviaire et de **protéger vos élevages ainsi que ceux qui se trouvent à proximité**.

