

Bulletin météorologique Hiver 2025/2026

L'Hiver 2025/2026 : Plus chaud et plus sec, mais avec des différences selon les mois

Ce bulletin a été élaboré à partir des données brutes des stations météorologiques d'AgriMeteo, service météorologique de l'Administration des services techniques de l'agriculture **ASTA** (Asselborn, Clemency et Remich pour les graphiques, ainsi que les stations supplémentaires Grevenmacher et Echternach pour la carte) ; et à partir des données vérifiées de la station météorologique de **MeteoLux**, département météorologique de l'Administration de la navigation aérienne, au Findel. L'analyse des précipitations et inondations a été réalisée avec l'expertise de l'Administration de la gestion de l'eau **AGE**.

Pour plus de détails : www.agrimeteo.lu, www.meteolux.lu et www.inondations.lu

Température


L'hiver 2025/2026 a été, dans l'ensemble, plus chaud que la normale climatique 1991–2020. Les anomalies de température ont varié entre +1.4 et +1.7 °C.

L'année 2025 s'est terminée sur des températures plutôt douces, avec une anomalie de +1.9 °C en décembre. Puis l'année 2026 a commencé avec des températures un peu plus froides : Le mois de janvier a été plus froid que la période de référence à Asselborn (−0.5 °C), à Clémency (−0.2 °C) et au Findel (−0.2 °C), tandis qu'à Remich, la température a correspondu à la normale (+0.0 °C). À l'image de l'hiver dans son ensemble, le mois de février a également été plus chaud que la normale et a présenté des anomalies positives jusqu'à +3.3 °C (Remich).

Précipitations

En ce qui concerne les précipitations, l'hiver a été plutôt sec : Les anomalies étaient entre −75.8 mm et −31.0 mm.

En décembre, des déficits ont été enregistrés pour toutes les stations analysées, avec des anomalies comprises entre −82.3 mm et −55.1 mm. En janvier, la même situation a été observée, à l'exception de Remich, où un léger excédent de +1.2 mm a été mesuré. En février, les précipitations ont été excédentaires pour toutes les stations : +47.4 mm à Asselborn, +35.6 mm à Clémency, +22.9 mm à Remich et +46.1 mm au Findel.




Anomalies de la température de l'air et des précipitations à différents endroits au Luxembourg, comparées à la normale climatique (1991-2020).

Source des données : ASTA & MeteoLux.


Les inondations au cours de l'hiver : Pas d'inondations notables en hiver à part quelques débordements très localisés en février le long la Moselle.

Conséquences des conditions météorologiques sur l'agriculture : Les **cultures d'hiver** ont, dans l'ensemble, bien passé l'hiver. Toutefois, sur les sols lourds du Gutland, l'engorgement en eau a localement causé des dégâts. L'orge d'hiver est particulièrement sensible, mais toutes les cultures sont touchées, surtout lorsque les semis avaient déjà été faits dans de mauvaises conditions, vu que l'automne était déjà très humide. En plus, un grand nombre de champs de céréales d'hiver n'ont pas encore pu être traités contre les mauvaises herbes. Il faudra donc rattraper ces interventions dès que possible, afin d'éviter un développement trop important des adventices. En Oesling, les sols se ressuent plus vite et les conditions devraient être suffisamment bonnes pour commencer les travaux prochainement. Outre les traitements phytosanitaires, il s'agit du semis des céréales de printemps. Sur les sols lourds du Gutland, les agriculteurs doivent encore se patienter davantage et espérer que le mois de mars connaîtra une période de beau temps suffisamment longue. En ce qui concerne les **cultures maraîchères**, la situation ne présente pas d'évolution marquante. Il convient toutefois d'espérer que les précipitations en février permettent de reconstituer les réserves en eau et que les températures douces ne stimulent pas excessivement la végétation des cultures fruitières. À la fin du mois de février, la somme des températures corrigées cumulées pour les prairies n'a pas encore atteint le seuil de 200 °C. Par conséquent, le début durable de la végétation ne s'est pas encore manifesté en surfaces herbagères. **Les vignobles** profitent des mois d'hiver pour accumuler de l'eau dans le sol. Jusqu'à présent, les précipitations ont été insuffisantes. Des pluies et des chutes de neige supplémentaires sont nécessaires pour reconstituer pleinement le potentiel hydrique du sol.



Cumul de précipitations à différents endroits au Luxembourg, comparées à la normale climatique (1991-2020).

Source des données : ASTA & MeteoLux.



Températures moyennes journalières de l'air à différents endroits au Luxembourg, comparées à la normale climatique (1991-2020).

Source des données : ASTA & MeteoLux.