



Empfehlungen zum Schutz der Hausschweine vor ASP

12 Präventive Maßnahmen

1

Zutritt für betriebsfremde Personen auf ein absolutes Minimum reduzieren.



2

Verhindern Sie direkten und indirekten Kontakt zwischen Haus- und Wildschweinen.




3

Vorrichtung (Matten oder Becken) zur Reinigung und Desinfektion der Schuhe.



4

Zwingender Kleiderwechsel beim Betreten oder Verlassen des Stalles.



5

Fremde Fahrzeuge, wenn möglich außerhalb des Betriebsgeländes parken.



6

Vorrichtung zur Reinigung und Desinfektion der Räder von Fahrzeugen bereitstellen.



Lesen Sie auf der Rückseite weiter



DIE REGIERUNG
DES GROSSHERZOGTUMS LUXEMBURG
Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau
und ländliche Entwicklung



Empfehlungen zum Schutz der Hausschweine vor ASP

12 Präventive Maßnahmen

7

Futtermittel „wildschweinesicher“ lagern. Kein Futter / Einstreu aus gefährdeten Gebieten im Schweinestall verwenden.



8

Mäuse und Ratten und andere schädlinge bekämpfen.




9

Hunde und Katzen aus dem Stall fernhalten.



10

Verschließbarer, leicht zu reinigender und desinfizierender Kadaverbehälter, der entladen werden kann, ohne das Betriebsgelände zu befahren



11

Bestandsregister aktuell halten (besonderes Augenmerk auf verendete Tiere)



12

Melden Sie verdächtige erkrankte oder verendete Tiere bei Ihrem Tierarzt oder der Veterinärinspektion.

