

Wichtige Anbautipps

Bodenansprüche:

Lehmige, humose Sandböden bis sandige Lehmboden, steinfrei, pH=5.5-6.5, keine Kalkung vor dem Kartoffelanbau.

Fruchtfolge:

Alle 4-5 Jahre, günstige Vorfrüchte sind Stoppelfrüchte und Getreide.

Grund- und Ertragsdüngung:

Ertragserwartung 350 dt/ha (Stufe C im Boden)	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Mittelfrühe Speisekartoffel	100-140-170*	102	245

* : maximale N-Dosis laut Entzugswerten PDR 2014-2020

Pflanzgutproduktion sowie Früh- und Speisekartoffel mit hohem Qualitätsanspruch:

Verhaltene N-Gaben bis max 100kg N/ha.

Organische Düngung: Stallmist, Herbstgabe.

Kaliumversorgung:

Einfluss auf Ertrag, Lagerung, Verfärbungen der Knollen, Beschädigungsempfindlichkeit, Kochtyp (TS-Gehalt), nur chloridfreie resp. chloridarme Dünger verwenden.

Pflanzung:

Mitte April bis Mitte Mai (ab 8°C Bodentemperatur).

Pflanzgutvorbereitung

Verwendung ausschliesslich von anerkanntem zertifiziertem Pflanzgut (blaue Etikette) gemäss luxemburg-

ischer Reglementierung bei keimträgen Sorten, Pflanzguterzeugung, Frühkartoffeln, Gartenanbau und auf trockenen Standorten.

Vorkeimen:

Bildung von 1-2 cm langen, kräftigen Keimen durch:

- Lagerung bei 10-12°C, hell, 80-85% Luftfeuchtigkeit, 3-4 Wochen
- anfänglicher Temperaturstoß von 15-20°C während 24-48 Stunden
- Vorkeimkisten (nicht mehr als 3 Lagen Knollen)
- Abhärtung durch Lichteinfluß (Beleuchtung, tagsüber im Freien)
- Für Frühkartoffel, Gartenanbau, Folienanbau

Keimstimmung:

Keimlinge von 2-3mm lang.

Lagerung bei Temperaturen zwischen 12-15°C in üblichen Behältern während 14-21 Tagen, unbedingt bei keimträgen Sorten im Speisekartoffelanbau (wie Anna-lena, Anuschka, Belana, Jelly) und Pflanzgutproduktion.

Wärmestoß: Von 25-30°C während 48 Stunden bei Zeitmangel und keimträgen Sorten.

Reihenweite und Legeabstand:

Speisekartoffelbau: 75 x 35-45 cm
Festkochende Sorten: 75 x 32-38 cm
(für mittelkalibrige Ware)
Gartenanbau: 3-4 Knollen/m²


Pflanzgutkaliber (mm):

Sortierung von: 28/35 (für Grosskaliber),
35/45 (für Mittelkaliber).

Legetiefe: 4-5cm tief, spätere Dammbildung mit 10-15 cm Boden über den Knollen.

ZORTEKATALOG

Gromperen 2022



Ausgabe 2022



LÉTZEBUERGER GROMPEREN -
EE GARANT FIR ÄREN ERFOLLEG!

Sorten	Reifegruppe	Ertrag	Kaliber	Schalefarbe	Fleischfarbe	Krautfäule	Knollenfäule	Ynin	G.Schorf	Kochtyp	Pommes Frites	Einkellerung
--------	-------------	--------	---------	-------------	--------------	------------	--------------	------	----------	---------	---------------	--------------

SEHR FRÜHE BIS FRÜHE SPEISESORTEN

Annabelle	I	5-6	5	G	HG	5	5	5	4	BA-B	/	2
Glorietta	HI	6	5-6	G	G	5	3	7	3	AB-BA	/	6-7
Corine	II	4-5	6-7	G	WG	3	3	9	5	B	7	3
Belana	II	7-8	5	G	HG	3	3	9	5	BA-B	/	6-7
Anuschka	II	7	7	G	HG	5	4	9	4	BA-B	2	6
Ukama	II	6	6-7	G	HG	6	3	9	6	BC	4	3
Red Scarlett	II	6-7	6-7	R	WG	3	5	9	3	B-BC	8	5

MITTELFÜHE BIS MITTELSPÄTE VEREDLUNGSSORTEN

Bintje	III	6	5-6	G	WG	7	7	9	7	BC-CB	7	4
Victoria	III	7	6-7	G	HG	5	5	9	4	B	8	7
Jelly	III-(IV)	7	7	G	G	5-6	3	9	3	B	7	6-7
Monalisa	III	5-6	7	G	WG-HG	7	7	6	6	B-BC	3	7
Laura	III	6-7	5-6	DR	G	5	3	9	3	BA-B	7	6
Désirée	III-IV	7	6-7	HR	WG-HG	5	3	9	8	BC	8	5

Sorten	Reifegruppe	Ertrag	Kaliber	Schalefarbe	Fleischfarbe	Krautfäule	Knollenfäule	Ynin	G.Schorf	Kochtyp	Pommes Frites	Einkellerung
--------	-------------	--------	---------	-------------	--------------	------------	--------------	------	----------	---------	---------------	--------------

MITTELFÜHE FESTKOCHENDE BIS VORWIEGEND FESTKOCHENDE SPEISESORTEN

Nicola	III	5-6	5	G	HG	5	7	2	3	B-BA	/	4
Annalena	III	7	6	G	G	5-6	4	9	3	BA-B	/	6-7
Emanuelle	III	7	5	G	G	5	3	9	3	BA-B	/	5
Charlotte*	I-III	6	5	G	HG	6	8	9	6	B	4	5
Heideniere	I-III	6	4-5	G-O	WG-HG	6	3	9	5	B-BC	k.A.	5
Linda	III	6-7	6	G-O	HG	5	3	5	3	BA-B	3	4-5

FÜR DEN BIOLOGISCHEN ANBAU EMPFOHLEN

Belana	II	7-8	6	G	G	3	3	9	5	BA-B	1	6
Anuschka	II	8	7	G	G-TG	5	4	9	4	BA-B	2	6
Désirée	III-IV	7	7	R	WG	5	3	9	8	B-BC	8	5

*: Kochtyp stark beeinflusst durch Witterung,
UWG Kontrollen notwendig;

Erklärungen

Bedeutung der Noten von 1 bis 9:

Niedrige Noten bedeuten eine geringe und hohe Noten eine starke Ausprägung der Eigenschaft (**Note 9:** sehr gut, sehr hoch - **Note 1:** sehr schlecht, sehr niedrig).

Reifegruppe:

I = Sehr früh, II = Früh, III = Mittelfrüh, IV = Mittelspät.

Farbe:

HG = Hellgelb, G = Gelb, DG = Dunkelgelb,
WG = Weiß-Gelblich, R = Rot, DR = Dunkelrot, O = Ocker.

Kochtyp (laut EAPR):

Kochtyp	
A, A-B	Festkochende Sorte (*bei T.S.-Gehalt > 19% mehligere Kocheigenschaften)
B-A, B	Vorwiegend festkochende, schwach mehligere Sorte
B-C, C-B, C	Lockere, mehligere und leicht trockene Sorte

Angaben basierend auf die Versuchsergebnisse aus den Sortenversuchen in Bettendorf, Binsfeld, Altrier und Drauffelt (Versuch aus dem biologischen Anbau).

Verantwortlich für des Editionen sinn:



LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural

Administration des services techniques
de l'agriculture



Lycée Technique
Agricole

